

Клещи проснулись

Первый укус клещом среди населения города Могилева и Могилевского района уже зарегистрирован в 1-ой декаде марта (07.03.2024).

По поступившей информации из учреждений здравоохранения за 2023 год число граждан, обратившихся с укусами клещами за медпомощью увеличилось на 21% по сравнению с 2022 годом (2023- 2984 чел., 2022 – 2469 чел.). В 2023 году пострадавшие от клеща были и дети - 520 чел. (17%).

Зараженность клещей в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом и составила 10,7% (2022- 9.7%).

В связи с потеплением климата, зараженностью клещей необходимо прогнозировать в 2024 году активизацию клещей. Основными переносчиками («хозяевами») для клещей являются грызуны, птицы, дикие животные и др. Человек случайно подвергается укусу клеща.

Клещ сам по себе не опасен, а опасны возбудители.

Клещи являются переносчиками многих заболеваний, но чаще всего Лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит.

Несмотря на снижение заболеваемости в 2023 году заболеваемости Лайм-боррелиозом среди населения на 19% по сравнению с 2022 годом (2023– 185 сл, 2022 – 235 сл.), остается очень важный вопрос: проведение профилактической экстренной профилактики при укусе клеща. Так, при проведении эпидрасследования было установлено, что заболевшие Лайм-боррелиозом в 93% не принимали профилактическое лечение.

В 2023 году среди населения города Могилева и Могилевского района зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита.

Заболевшие клещевым энцефалитом отмечали посещение лесных массивов, прилегающих к деревням, дачным участкам.

Заболевания клещевыми инфекциями легче предупредить, чем лечить.

В целях профилактики клещевых инфекций для индивидуальной защиты населения от нападения иксодовых клещей необходимо:

- отправляясь на отдых в лес, в природные условия одеть светлую одежду с длинными рукавами, заправить брюки в носки.;
- одежду обработать акарицидными репеллентами (Kontra, OZZ и др.) согласно прилагаемой инструкции к препарату;
- собак, кошек после посещения лесной зоны необходимо осмотреть на наличие присосавшихся клещей, при обнаружении клеща - провести его удаление с соблюдением правил личной безопасности (использование перчаток);
- после посещения леса тщательно осмотреть кожные покровы на наличие клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща, нельзя его раздавливать, необходимо удалить и принять профилактическое лечение. В городе Могилеве эту помощь могут оказать в хирургическом кабинете территориального ЛПО, в выходные дни, вечернее и ночное время – в травматологическом пункте (г.Могилев, ул. Пионерская, 15) - у взрослых, детей в травмпункте – УЗ «МОДБ» (Могилев, Бирули 9).

Необходимо помнить, что клещевыми инфекциями (**клещевым энцефалитом**) можно заболеть и при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому употреблять продукты (молоко, сметана и др.) рекомендуется только после кипячения. Чтобы вирус погиб, достаточно кипячение в течение 2–3 минут

Очень важно для пострадавших от клеща! Если Вы самостоятельно удалили клеща, не забудьте принять профилактическое лечение в первые 72 часа после укуса.